

Forme et présentation : Comprimés sécables oblongs (roses). Blisters de 20 comprimés. Composition : Prazépam (D.C.I.). Par comprimé 40 mg. Par blister 800 mg. Excipient : cellulose excipient, stéarate de magnésium, amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, laque aluminique d'érythrosine, laque aluminique de jaune de quinoléine. Sort du médicament : Se reporter au Dictionnaire Vidal. Propriétés : Benzodiazépine : anxiolytique, sédatif, anticonvulsivant, myorelaxant. La demi-vie longue est intéressante dans le cas de la recherche d'un effet prolongé d'une action anxiolytique. Indications : - États anxieux sévères résistant à des posologies plus faibles, - cures de désintoxication alcoolique et prévention des accidents de sevrage. Contre-indications : - Allergie connue aux benzodiazépines, - insuffisance respiratoire sévère. Mise en garde : Durée du traitement : le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement, car peu d'études permettant d'apprécier le maintien de l'efficacité d'un traitement au long cours sont actuellement disponibles. Phénomène de sevrage : un syndrome de sevrage peut survenir à l'arrêt brutal d'un traitement prolongé, surtout à doses élevées. Dans de telles situations, il est recommandé, par prudence, de réduire progressivement les doses, ou en cas d'arrêt brutal, de surveiller très attentivement le malade. Cela est bien une mesure de prudence, car la demi-vie du métabolite actif étant de 65 heures, une semaine après l'arrêt du traitement le taux sérique a une valeur encore égale à 17% de la valeur du plateau d'équilibre. Précautions : Grossesse et allaitement, Myasthénie, Dépression, Insuffisance respiratoire modérée. Se reporter au Dictionnaire Vidal. L'absorption de boissons alcoolisées est formellement déconseillée pendant la durée du traitement. L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. En cas d'insuffisance rénale et/ou d'insuffisance hépatique, il peut être nécessaire d'adapter la posologie. Interactions médicamenteuses : Synergie additive : avec les déprimeurs neuromusculaires (curares, myorelaxants). Avec d'autres médicaments déprimeurs centraux (en particulier, certains neuroleptiques : la prise simultanée pourrait majorer la sédation). Le risque d'apparition de syndrome de sevrage est majoré par l'association de benzodiazépines prescrites comme anxiolytiques ou comme hypnotiques. Effets indésirables : Se reporter au Dictionnaire Vidal. Posologie : Cette spécialité est réservée à l'adulte. La posologie quotidienne est de 20 mg (un demi-comprimé), 60 mg (un comprimé et demi), en moyenne 40 mg : un comprimé ; à prendre de préférence le soir. Chez le sujet âgé, il est recommandé de diminuer la posologie : par exemple, la moitié de la posologie moyenne peut être satisfaisante. Surdosage : En cas de prise massive, les signes de surdosage se manifestent principalement par un sommeil profond, pouvant aller jusqu'au coma selon la quantité ingérée. Le pronostic est bénin, en l'absence toutefois d'association à d'autres psychotropes. La surveillance portera principalement sur les fonctions respiratoires et cardiovasculaires en milieu spécialisé. L'évolution est favorable. Tableau A - AMM : 326107.2. Prix : 24,60 F + S.H.P. Coût du traitement journalier : 1,23 F.

Remboursement Sécurité Sociale à 70% - Collectivités.

PARKE-DAVIS  
DIVISION SUBSTANTIA

# ANXIÉTÉ SÉVÈRE



LYSANXIA 40mg  
PRAZÉPAM