


Actualité de la Détresse : Les tourments de l'humeur



DEPAMIDE

VALPROMIDE

La Réponse CLIN DIPHAC
au service de votre présent



DEPAMIDE VALPROMIDE - FORME ET PRESENTATION : Boîte de 30 comprimés enrobés gastro-résistants dosés à 300 mg de valpromide. **PROPRIETES :** Anticonvulsivant. Sédatif. **INDICATIONS :** Traitement adjuvant dans les épilepsies avec manifestations psychiatriques. **Proposé dans :** - La prévention des rechutes chez les malades atteints de psychose maniaco-dépressive et présentant une contre-indication à l'emploi du lithium. - Les états d'agressivité d'origines diverses. **PRECAUTIONS D'EMPLOI :** - Surveillance particulière chez les vieillards et chez les sujets atteints d'affections organiques graves. - Potentialisation des effets de l'alcool. L'absorption de boissons alcoolisées pendant le traitement est donc formellement déconseillée. **Grossesse :** pas de données précises à ce jour concernant DEPAMIDE. Ce dernier se transformant en grande partie en acide valproïque, des moyens contraceptifs efficaces sont indiqués pendant la durée du traitement. Si une grossesse est envisagée ou si une grossesse est en cours, peser à nouveau l'indication du traitement. Surveillance anténatale. **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :** - Potentialisation des effets d'autres psychotropes, psycholeptiques ou antidépresseurs surtout à doses élevées. - Risque d'asthénie ou de somnolence en cas d'adjonction aux barbituriques ou à d'autres médicaments dépressifs du SNC. - Association déconseillée avec la carbamazépine. **EFFETS INDESIRABLES :** Le plus souvent, en association avec d'autres psychotropes : manifestations sédatives, hypotoniques, confusionnelles et quelquefois confuso-oniriques. Le valpromide ayant pour métabolite actif l'acide valproïque, les effets indésirables observés avec le valproate de sodium (Dépakine) sont susceptibles de survenir lors de traitements par Dépakine. La survenue d'hépatopathies est exceptionnelle. Néanmoins, l'apparition soudaine de signes généraux (malaise, nausées, vomissements, somnolence...) doit faire évoquer le diagnostic et pratiquer un contrôle biologique des fonctions hépatiques (taux de prothrombine notamment). **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :** Les doses quotidiennes conseillées chez l'adulte en fonction des indications sont : - dans les troubles thymiques : **Accès maniaques :** posologie initiale : 4 à 6 comprimés. traitement d'entretien : 2 à 4 comprimés. **Etats dépressifs :** posologie initiale : 1 à 3 comprimés. traitement d'entretien : 2 à 4 comprimés. - dans le traitement adjuvant des épilepsies avec manifestations psychiatriques, états agressifs : en moyenne 2 à 6 comprimés. Répartir les doses en 2 prises, matin et soir, de préférence au cours des repas. Mise en route du traitement : - si DEPAMIDE est prescrit seul, les doses utiles peuvent être administrées d'emblée ou par paliers ascendants de 2 à 3 jours. - s'il s'agit d'un malade déjà en traitement et recevant d'autres psychotropes, il convient d'introduire DEPAMIDE progressivement pour atteindre la dose optimum en deux semaines environ, et de réduire simultanément peu à peu la posologie des psychotropes associés pour la ramener à la moitié ou même au tiers des doses initiales. **Coût du traitement journalier :** 1,51 à 9,06 F. **SURDOSAGE :** Coma calme plus ou moins profond avec hypotonie musculaire, hyporéflexie, myosis, diminution de l'autonomie respiratoire. **LISTE II A.M.M. 320 706.1.** Mis sur le marché en 1980 sous forme de comprimés (1^{ère} mise sur le marché en 1971 sous forme de gélules). **PRIX :** 45,30 F. Remb. Séc. Soc. à 65% - Collectivités. *Pour une information plus détaillée, consulter le dictionnaire des spécialités.* **TITULAIRE DE L'A.M.M. LABORATOIRES LABAZ 94258 GENTILLY CEDEX**

SANOPI WINTROP

DEPARTEMENT CLIN DIPHAC

oxylite

ETATS DEPRESSIFS
ETATS
ANXIO-DEPRESSIFS


STABLON
TRAITE LA DEPRESSION
DANS TOUTES SES
COMPOSANTES
L'EFFET ANTIDEPRESSEUR
DE STABLON EST
A LA FOIS ANXIOLYTIQUE
ET REDYNAMISANT

STABLON

12,5 mg tianeptine
ANTIDEPRESSEUR ANXIOLYTIQUE REDYNAMISANT

Propriétés: *Antidépresseur.* Chez l'animal, la tianeptine augmente l'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hippocampe et accélère la récupération. Chez l'homme, Stablon se caractérise par une activité: -sur les troubles de l'humeur; -sur les plaintes somatiques liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur; -sur les troubles du comportement de l'éthylé en période de sevrage. *Stablon est dépourvu d'effet: -sur le sommeil et la vigilance; sur le système cardiovasculaire; sur le système cholinergique (absence de manifestation anticholinergique).* **Composition-présentation:** Boîte de 30 comprimés enrobés, dosés à 12,5 mg de tianeptine (sel de sodium). **Indications thérapeutiques:** -Etats dépressifs névrotiques et réactionnels, -états anxiodépressifs avec plaintes somatiques en particulier digestives, -états anxiodépressifs observés chez l'alcoolique en période de sevrage. **Contre-indications:** Enfants de moins de 15 ans, IMAO, grossesse, allaitement

Précautions d'emploi: Par principe, surveillance attentive en début de traitement (risque suicidaire inhérent aux états dépressifs), précaution en cas d'anesthésie, information des conducteurs de machine d'un risque potentiel (cf VIDAL), réduction progressive de la posologie à l'arrêt du traitement. **Interactions médicamenteuses:** IMAO. **Effets indésirables:** Rares, généralement bénins: -gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, -insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie, -tachycardie, extrasystoles, précordialgies, -vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, -gêne respiratoire, boule dans la gorge, -myalgies, lombalgies. **Posologie et mode d'administration:** 3 comprimés par jour, matin, midi et soir. Chez l'alcoolique, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, 2 comprimés par jour. C.T.J. de 4,82F à 7,23F. Liste I. AMM: 329.339.1. Prix: 72,30F. Remb. Séc. soc. 65%. Collect. Laboratoire ARDIX, 25 rue Eugène Vignat, 45007 Orléans. Pour plus d'information se reporter au VIDAL.



**3 COMPRIMÉS
PAR JOUR**