

EUROPEAN PSYCHIATRY

THE JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF EUROPEAN PSYCHIATRISTS

- ◆ 8 issues per year
- ◆ supplements devoted to specific symposia
- ◆ indexed in Current Contents

Editors-in-chief

P Boyer
Paris, France
Y Leclercq
Paris, France

Editors Emeritus

C Ballus
Barcelona, Spain
H Heimann
Tübingen, Germany

Editors

JD Guelfi
Paris, France
R Murray
London, United Kingdom
M Maj
Naples, Italy
CB Pöll
Luxembourg
M Ackenheil
Munich, Germany
P Bech
Copenhagen, Denmark

Indexed in

Biological Abstracts/Biosis, CNRS/Pascal, Current
Contents/Clinical Medicine and Social & Behavioural
Sciences, Excerpta Medica/EMbase, Psychological
Abstracts, Research Alert, SciSearch

Since 1991, *European Psychiatry* has been the official journal of the Association of European Psychiatrists (AEP).

European Psychiatry presents the results of original research relative to those numerous diverse fields currently of interest to psychiatrists: psychopathology, nosography, chemotherapy, psychotherapy, clinical methodology, biological disorders and mental pathology, psychophysiology, neuropsychophysiology, relative to therapeutics, clinical and basic research as well as animal behaviour.

This wide scope is aimed at encouraging the exchange of ideas and research within Europe and establishing within the international psychiatric community an improved level of scientific communication.

European Psychiatry endeavours to publish not only high scientific level original articles, short communications, editorials, letters to the editor but also AEP newsletters, book reviews, information on new regulations in Europe and a conference calendar.

Subscribe today!
by phone (33) 01 45 58 90 67 by fax (33) 01 45 58 94 24

EUROPEAN PSYCHIATRY – 1997 – Volume 12 in 8 issues – ISSN 0924-9338

Please, send to:



PUBLICATIONS
ELSEVIER

Subscription Department
141, rue de Javel
75747 Paris cedex 15, France

Please,

enter my 1997 subscription to *European Psychiatry*

France: Individuals* 850 FF – Institutions 1,995 FF

EU: Individuals* 1,050 FF – Institutions 2,287 FF

EU (VAT registration no: _____) and other countries: Individuals* 1,028 FF – Institutions 2,240 FF

North, Central & South America: 447 US\$

All prices include postage and handling

find my check enclosed payable to ESME

debit my credit card (CB, MasterCard or Visa)

No _____ Expires _____ Signature: _____

send me an invoice

send me a free sample copy

A special rate is available to the members
of the Association of European Psychiatrists

NAME _____

TITLE _____

SPECIALITY _____

FUNCTION _____

ADDRESS PROFESSIONAL PERSONAL _____

POSTAL CODE/CITY/STATE _____

* Special subscription conditions for individuals: payment must be direct from the individual and subscription delivery to the individuals personal address.

FY7AP



STABLON

Tianeptine 12,5 mg

le fil rouge pour sortir de la dépression

Composition - présentation : Boîte de 30 comprimés enrobés, dosés à 12,5 mg de tianeptine (sel de sodium). **Propriétés :** Antidépresseur. Chez l'animal, la tianeptine augmente l'activité spontanée des cellules pyramidales de l'hippocampe et en accélère la récupération. Chez l'homme, Stablon se caractérise par une activité : - sur les troubles de l'humeur ; - sur les plaintes somatiques liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur ; - sur les troubles du comportement de l'éthylique en période de sevrage. Stablon est dépourvu d'effet : - sur le sommeil et la vigilance ; - sur le système cardiovasculaire ; - sur le système cholinergique (absence de manifestation anticholinergique). **Indications thérapeutiques :** Épisodes dépressifs majeurs - c'est-à-dire caractérisés : Stablon est préconisé dans les états dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère. **Contre-indications :** Enfants de moins de 15 ans, IMAO, grossesse, allaitement. **Précautions d'emploi :** Par principe, surveillance attentive en début de traitement (risque suicidaire inhérent aux états dépressifs), précaution en cas d'anesthésie, information des conducteurs de machine d'un risque potentiel (cf. Vidal), réduction progressive de la posologie à l'arrêt du traitement. **Interactions médicamenteuses :** IMAO. **Effets indésirables :** Rares, généralement bénins : - gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, - insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie, - tachycardie, extrasystoles, précordialgies, - vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, - gêne respiratoire, boule dans la gorge, - myalgies, lombalgie. **Posologie et mode d'administration :** 3 comprimés par jour, matin, midi et soir. Chez l'alcoolique, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, 2 comprimés par jour. CTJ de 4,81 F à 7,22 F. Liste I. AMM : 329.339.1. Prix : 72,20 F. Remb. Séc. soc. 65 %. Collect. Information médicale : ARDIX Médical - 27, rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine Tél : 01 46 41 60 00. Les Laboratoires Servier - 22, rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine. Pour plus d'informations se reporter au Vidal.

